

R8年後期除草特集号

令和8年6月5日
 白山石川営農推進協議会
 石川県農業共済組合
 白山農業協同組合

●ノビエの取りこぼしが多いとき

薬剤名	使用時期	使用量 (10a 当たり)	使用方法	使用上の注意
ヒエクリーン 1キロ粒剤 (豆つぶ)	移植後15日～ ノビエ4葉期 (但し、収穫45日前まで)	1kg (250g)	湛水状態で散布 遅効性だが抑草期 間は長い(1回)	①水の出入りを止めて湛水状態のまま田面に 均一に使用する。 ②使用後7日間は湛水状態を保ち、落水、か け流しをしない。
クリンチャー 1キロ粒剤 (ジャンボ)	移植後7日～ ノビエ4葉期 (但し、収穫30日前まで) 移植後25日～ ノビエ5葉期 (但し、収穫30日前まで)	1kg (20パック) 1.5kg (30パック)	湛水状態で散布 残効性がないので 処理時期を見極め て散布する (2回以内)	
クリンチャーEW	移植後20日～ ノビエ6葉期 (但し、収穫30日前まで)	薬量100ml 希釈水量 25～100ℓ (250～1,000 倍)	湛水散布又は 落水状態で散布 (2回以内)	①展着剤(ハイテンパワー等)を加用する。 ②均一に雑草茎葉散布する。 ③7日間は強制落水、かけ流しをしない。
トドメ MF 1キロ粒剤	移植後14日～ ノビエ5葉期まで (但し、収穫50日前まで)	1kg	湛水状態で散布 (3回以内)	①水の出入りを止めて湛水のまま田面に均一 に使用する。 ②使用後3～4日間は湛水状態を保ち、7日 間は強制落水、かけ流しをしない。 ③強風時には使用しない。
トドメ MF 乳剤	移植後14日～ ノビエ7葉期まで (但し、収穫50日前まで)	薬量200ml 希釈水量 25～100ℓ (125～500 倍)	湛水散布又は 落水散布 (2回以内)	①展着剤は不要。 ②均一に雑草茎葉散布する。 ③7日間は強制落水、かけ流しをしない。



●ノビエや広葉雑草の取りこぼしが多いとき

薬剤名	使用時期	使用量 (10a 当たり)	使用方法	使用上の注意
アトトリ 1キロ粒剤 (豆つぶ)	移植後14日～ ノビエ4葉期まで (但し、収穫45日前まで)	1kg (250g)	湛水状態で散布 (1回)	①水の出入りを止めて湛水のまま田面に均一 に散布する。 ②使用後7日間は湛水状態を保ち、落水、かけ 流しをしない。
レプラス 1キロ粒剤 (ジャンボ)	移植後14日～ ノビエ4葉期まで (但し、収穫60日前まで)	1kg (10パック)		
レプラスギア 1キロ粒剤 (ジャンボ)				
ワイドショット 1キロ粒剤	移植後15日～ ノビエ4葉期 (但し、収穫45日前まで)	1kg		
クリンチャー バス ME 液剤	移植後15日～ ノビエ5葉期まで (但し、収穫50日前まで)	薬量 1,000 ml 希釈水量 70～100ℓ (70～100 倍)	落水散布又は、 ごく浅い湛水状態 で散布 (2回以内)	①使用液は使用当日に調製すること。 ②展着剤は加用しない。 ③使用前に落水状態にして水の出入りを止め、 田面に均一に散布する。 ④使用後7日間はそのままの状態を保ち、落 水、かけ流しをしない。 ⑤晴天の持続する時を選んで使用する。軟弱苗 への使用、重複散布、DCPA 剤との近接散 布、高温条件の使用はさける。

広場雑草の画像は裏面に

●広葉雑草が多いとき

薬剤名	使用時期	使用量 (10a 当たり)	使用方法	使用上の注意
バサグラン粒剤	移植後15日～ (但し、収穫45日前 まで)	3～4kg	落水散布又は ごく浅く湛水して 散布(1回)	①晴天時に使用し、使用后3日間は入水しない。 ②1年生イネ科雑草には効果がない。 ③多年生雑草が部分発生している場合は、落水してスポット処理する。
ロイヤント乳剤	移植後20日～ ノビエ5葉期 (但し、収穫45日前 まで)	薬量200ml 希釈水量 25～100ℓ (125～500 倍)	落水散布又は、 ごく浅く湛水して 散布 (2回以内)	①散布後3日後を目安に入水する。 ②ホタルイ、クログワイ、コウキガラヤには効果が劣る。
ワイドアタック SC	移植後20日～ ノビエ6葉期 (但し、収穫30日前 まで)	薬量 100 ml 希釈水量 100ℓ (1,000 倍)		晴天時に使用し、使用后3日間は入水しない。



ホタルイ



コナギ



オモダカ



ウリカワ



セリ



ミズガヤツリ



クログワイ

●クサネム

薬剤名	使用時期	使用量 (10a 当たり)	使用方法	使用上の注意
ノミニー液剤	移植後30日～ クサネムの草丈40cm まで (但し、収穫60日前 まで)	50～100ml 希釈水量 100ℓ (1,000～2,000 倍)	落水散布又は、 ごく浅い湛水状態 で散布 (1回)	①雑草の生育期に薬液が茎葉全体に均一にかかるとように加圧噴霧機などで散布する。 ②3日以上落水(浅水)状態を保つ。 ③散布後、6時間以内に降雨が予想される場合は使用を控える。



クサネム



イボクサ